

de rupture possible. Enfin, évoquons la question de l'énergie. *Chandra*, par exemple, pèse cinq tonnes. C'est le plus gros satellite jamais envoyé par la navette spatiale. Pourtant, il ne consomme pas plus de puissance qu'une plaque électrique ! Les instruments embarqués doivent être conçus pour consommer peu et utiliser efficacement le peu d'énergie disponible. C'est une contrainte importante.

**Pour la Science : À ces limites techniques, ne doit-on pas ajouter les contraintes théoriques ? Comment évaluer la distance des objets célestes sans repère absolu ? Comment tenir compte de l'expansion de l'Univers ?**

**Roland Lehoucq :** Commençons par un problème très important, celui de l'évaluation de la distance. En astrophysique, tous les objets semblent disposés sur une sphère, la sphère céleste, et l'on n'a, *a priori*, aucune information sur leur distance. Quand on observe un point brillant, cela peut être une bougie toute proche ou une supernova extrêmement éloignée. Déterminer la distance permet de se faire une idée de la luminosité intrinsèque de l'objet observé, car une luminosité apparente faible n'est pas nécessairement synonyme d'éloignement. Les mesures effectuées par le satellite *Hipparcos* ont révolutionné la connaissance de notre univers proche. Ce satellite a directement mesuré la distance de près de 100 000 étoiles. Ces mesures ont révélé que 80 pour cent des distances d'étoiles que l'on avait évaluées auparavant présentaient des erreurs comprises entre 10 et 20 pour cent. Comme toutes les autres méthodes d'estimation des distances sont fondées sur la connaissance de celles des étoiles les plus proches, on comprend l'intérêt des mesures astrométriques d'*Hipparcos*, et de son successeur *Gaïa*, qui devrait observer 10 000 fois plus d'étoiles !

Parle-t-on d'éloignement spatial ou d'éloignement temporel ? En fait, les deux sont liés. Quand on reçoit un rayonnement lumineux, il a voyagé dans l'espace et conjointement dans le temps. De plus, comme l'Univers est en expansion, la lumière qui, au départ, était dans la gamme visible, arrive avec une longueur d'onde différente de celle qu'elle avait à l'émission : elle est décalée vers le rouge. Plus ce décalage (en anglais, *redshift*) est important, plus l'objet observé est éloigné. Ce paramètre nous permet d'ordonner les objets célestes dans le temps et dans l'espace. Pour en déduire une distance ou un temps de parcours de la lumière, il faut un modèle cosmologique décrivant l'évolution dynamique de l'Univers. Disposant d'un tel modèle et du décalage vers le rouge d'un objet particulier, on peut calculer séparément sa distance et le temps que sa lumière a mis pour nous parvenir. Selon le taux d'expansion de l'Univers, la lumière n'aura pas mis le même temps pour arriver et la distance de l'objet s'en trouvera modifiée : ainsi les distances calculées reposent sur le choix du modèle cosmologique, ce qui impose une limite théorique.

**Pour la Science : La mesure des distances des étoiles est donc une limite qu'on devrait franchir. Mais comment évalue-t-on les distances des objets situés aux confins de l'Univers ?**

**Roland Lehoucq :** Aujourd'hui, les objets les plus lointains observés ont un décalage vers le rouge voisin de dix. En fait, le décalage le plus lointain que l'on puisse observer, c'est celui du fond diffus cosmologique : il vaut 1 100. Nous l'avons évoqué, le fond diffus cosmologique est une lumière émise au moment où la matière de l'Univers est passée d'un état

*Si certaines contraintes techniques seront levées, certaines limites théoriques persisteront, notamment le fait que l'astrophysicien observe l'Univers de l'intérieur et d'une position particulière.*

de plasma à celui où les électrons et les noyaux se sont combinés pour former des atomes neutres. Dans un plasma, la lumière diffuse très facilement sur les électrons, qui sont séparés des noyaux. En revanche, dès que les électrons et les atomes ionisés se combinent, la lumière cesse quasiment d'interagir avec les électrons de la matière (à l'exception de quelques longueurs d'onde particulières). Le plasma, opaque à la lumière visible, devient matière neutre : elle est transparente. Toute la lumière émise au moment de la recombinaison (des électrons avec les atomes ionisés) a commencé à se propager dans toutes les directions de l'Univers, et nous parvient aujourd'hui après 13,7 milliards d'années d'expansion. À cause du décalage vers le rouge, on la reçoit sous forme d'un rayonnement micro-ondes, qui porte la trace de l'état de la matière au moment où l'Univers est devenu transparent. Le fond diffus cosmologique est une frontière absolue, au-delà de laquelle l'Univers est opaque. C'est une limite intrinsèque à l'observation de l'Univers dans le domaine des ondes électromagnétiques.

Ainsi, l'exploration de l'Univers est soumise à des contraintes techniques que l'on repousse progressivement. Elle est aussi soumise à des contraintes théoriques intrinsèques au modèle cosmologique, et l'on ne pourra jamais observer le rayonnement initial, au-delà du fond diffus cosmologique, du moins si l'on reste dans le domaine des ondes électromagnétiques. Une des solutions consistera sans doute à explorer l'Univers plus jeune avec des signaux différents des ondes électromagnétiques (mais cela ne sera guère facile). Enfin, contrairement au physicien qui observe de l'extérieur le système sur lequel il expérimente, l'astrophysicien observe de l'intérieur l'Univers qu'il étudie : situé au milieu d'une clairière, il ignore si les arbres qu'il observe ne représentent qu'un mince rideau d'arbres ou une épaisse forêt ! C'est une limite incontournable, inhérente à la position de l'homme dans l'Univers.

**Roland LEHOUCQ** est astrophysicien dans le Service d'astrophysique du Commissariat à l'énergie atomique, CEA, de Saclay.

Ce texte est un résumé d'une conférence que Roland Lehoucq a donnée au Palais de la Découverte. Le texte intégral de la conférence sera en ligne sur le site de France Culture (<http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture/sommaire/>) durant le mois d'août 2006.

## Les prémices de la pensée symbolique

Des coquillages percés, découverts sur des sites algériens et israéliens, font remonter la parure – et la pensée symbolique – à plus de 100 000 ans.



M. Vanhaeren et F. d'Errico, CNRS

En 2004, Francesco d'Errico et Marian Vanhaeren du CNRS et deux collègues sud-africains avaient analysé 41 petits coquillages de l'espèce *Nassarius kraussianus* découverts dans la grotte de Blombos, en Afrique du Sud. Ils avaient déduit de leur nature (non alimentaire), des trous (pratiqués par l'homme) et de l'usure due à leur port qu'il s'agissait de parures. Selon eux, ces ornements étaient destinés à modifier l'image de la personne qui les portait en symbolisant son sexe, son âge, son appartenance à un groupe ou encore son rôle au sein de ce groupe. Or les coquillages percés de Blombos datent de 75 000 ans. La pensée symbolique aurait donc au moins cet âge...

Toutefois, M. Vanhaeren et F. d'Errico ont considéré que les perles de Blombos ne suffisaient pas à établir sans contestation possible l'ancienneté de l'ornementation personnelle. Ils ont retrouvé d'autres coquillages percés dans les musées et en ont fait l'analyse avec des confrères anglais et israéliens. Ainsi, au musée de l'Homme à Paris, ils ont découvert une boîte contenant un coquillage percé du genre *Nassarius gibbosulus* entreposé avec d'autres collections au Laboratoire de Préhistoire par Jean Morel. Dans les années 1940, ce préhistorien fouilla dans l'Est de l'Algérie le site de l'oued Djebbana, situé à 200 kilomètres

Dans cette boîte (a), le préhistorien Jean Morel a soigneusement entreposé le coquillage percé qu'il a trouvé sur le site de l'oued Djebbana dans les années 1940. D'autres perles de ce type avaient déjà été mises au jour : ce sont des coquillages du genre *Nassarius* percés par l'homme, il y a quelque 75 000 ans (b).

à l'intérieur des terres, un site de la culture atérienne. Cette culture nord-africaine serait issue, pense-t-on, de la culture moustérienne (-300 000 à -30 000). En Europe, on associe généralement la culture moustérienne aux Néandertaliens, mais, du moins au Proche-Orient, elle l'est aussi avec l'homme moderne, *Homo sapiens sapiens*. Malheureusement, on ne dispose que d'une datation ancienne au carbone 14 du site de l'oued Djebbana, qui établit seulement que son âge est supérieur à 35 000 ans. De nouvelles datations suggèrent aujourd'hui que les âges de plusieurs sites atériens seraient compris entre 60 000 et 90 000 ans.

Les chercheurs ont aussi retrouvé d'anciens coquillages percés au Muséum d'histoire naturelle de Londres, dont deux exemplaires appartiennent à l'espèce du coquillage algérien. Ils proviennent du site moustérien de Skhul, fouillé dans les années 1930 en Palestine par des préhistoriens anglais. L'analyse des concrétions attachées à l'un des deux spécimens révèle que ces coquillages proviennent de la couche qui a livré plusieurs sépultures d'humains modernes. Or les datations récentes des restes trouvés à Skhul indiquent un âge compris entre 100 000 et 135 000 ans!

Ainsi, deux nouveaux indices, dont l'un est incontestable, attestent que l'ornementation personnelle remonte à 100 000 ans au moins. En outre, ils suggèrent qu'elle est venue d'Afrique avec les hommes modernes. Une version différente de la vision classique qui faisait remonter l'apparition de la pensée symbolique à l'arrivée d'*Homo sapiens sapiens* en Europe, il y a 40 000 ans.

François Savatier

Science, vol. 312, pp. 1785-1788, 23 juin 2006

## PLUSIEURS SOUCHES DE LA GRIPPE AVIAIRE DÉTECTÉES AU NIGERIA

**L**e 7 février dernier, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) publie le premier rapport officiel de la présence du virus hautement pathogène de la grippe aviaire H5N1 en Afrique. Le Nigeria – premier producteur de volailles sur le continent – est touché, avec un premier foyer d'infection dans l'État de Kaduna, au Nord du pays.

L'Institut d'immunologie du Laboratoire de santé (LNS) du Luxembourg collabore depuis cinq ans déjà avec le Département de médecine vétérinaire de l'Université d'Ibadan (Sud-Ouest du Nigeria) sur différents projets de recherche en virologie aviaire. Dès l'annonce du premier foyer de grippe aviaire, un appel à l'aide nous parvient : il faut détecter et contrôler au plus vite H5N1. Trois experts du Luxembourg se rendent sur place, avec des réactifs et des équipements pour le diagnostic et la biosécurité. Très vite, malgré les fréquentes coupures d'électricité et malgré la chaleur, une équipe nigériane est formée à la détection moléculaire du virus. Grâce à une collaboration efficace entre éleveurs, vétérinaires et chercheurs, des dizaines d'échantillons aviaires arrivent chaque jour de tout le Sud-Ouest nigérian au laboratoire d'Ibadan et sont testés.

Des virus de deux élevages de l'État de Lagos (sur la côte Sud-Ouest du Nigeria) sont isolés, en collaboration avec le Dépar-

LNS, Luxembourg



tement de virologie du Centre médical universitaire Erasmus de Rotterdam, aux Pays-Bas, puis sont séquencés. Les résultats montrent que ces virus viennent de la zone Asie de l'Ouest/Russie/Europe/Afrique et sont différents des souches présentes en Asie du Sud-Est. Qui plus est, les souches des deux élevages du Sud-Ouest et la souche du premier foyer dans le Nord nigérian sont très différentes, aussi éloignées l'une de l'autre qu'elles le sont des souches russes, par exemple. Cela indique que plusieurs souches d'H5N1 ont été introduites au Nigeria.

Pour le moment, on ignore comment elles l'ont été : par des oiseaux migrateurs ? Par des volailles vivantes contaminées importées de pays où sévit la grippe aviaire ? Quoi qu'il en soit, les mesures prises (élevages contaminés abattus, zones de sécurité de trois kilomètres autour des fermes concernées) semblent avoir limité la multiplication des foyers d'infection, et les souches des foyers déclarés étant différentes, cela signifie que l'épidémie ne s'est pas propagée de ferme à ferme. Aucun cas de contamination humaine n'a été rapporté pour le moment.

Mariette Ducatez, Institut d'immunologie, LNS, Luxembourg

*Nature*, vol. 442, p. 37, 6 juillet 2006


## La confiance règne

**L'**idéal pour choisir un dentiste serait d'en voir plusieurs à l'œuvre et d'opter pour celui qui prodigue les meilleurs soins, surtout les moins douloureux. Hélas, peu de praticiens s'offrent ainsi en démonstration et nous en sommes réduits à faire confiance au bouche à oreille. D'autres sont mieux lotis : Redouan Bshary, de l'Université de Neuchâtel, en Suisse, et Alexandra Grutterqui, de l'Université du Queensland, en Australie, ont montré que certains poissons qui souhaitent se débarrasser de leurs parasites cutanés observent le comportement des poissons nettoyeurs avant d'en choisir un. Ce faisant, ils s'assurent du meilleur traitement et... nous le verrons, refrènent la gourmandise du nettoyeur.

Un nettoyeur peut éliminer chaque jour les parasites de 100 à 200 poissons (de 30 à 50 espèces différentes), au cours de 2000 séances. Cependant, la tentation est grande de se nourrir du mucus visqueux sécrété par la

peau des clients, qui est autrement plus nourrissant et à leur goût. Pourquoi les nettoyeurs-tricheurs ne sont-ils pas aussi nombreux qu'on pourrait l'attendre dans de telles conditions ? C'est là que l'observation prend tout son sens.

Les éthologistes ont étudié un client (*Scolopsis bilineatus*, ci-contre en haut) dans un aquarium où il pouvait suivre l'activité de deux nettoyeurs (*Labroides dimidiatus*, ci-contre en bas) : l'un était coopératif et s'occupait avec zèle d'un poisson factice (recouvert d'une nourriture qui convenait au nettoyeur) ; l'autre se désintéressait du modèle (dépourvu de toute friandise). Le client passa beaucoup plus de temps avec le premier, en apparence coopératif ! Une deuxième expérience a montré que les nettoyeurs dédaignent souvent leur nourriture favorite et lui préfèrent une nourriture moins à leur goût, si celle-ci leur est fournie avec plus de régularité. Ainsi, dans une forme de mutualisme que l'on croyait réservée aux



Uriele Masaki



Vincent Tomena

humains, les nettoyeurs se contentent des parasites et se « défendent » de la tentation pour s'assurer une nourriture abondante, le client privilégiant les nettoyeurs respectueux. Même les poissons (nettoyeurs) se mettent à la place de l'autre (le client) pour espérer le meilleur gain.

Loïc Mangin

*Nature*, vol. 441, pp. 975-978, 2006