LES NOMBRES DE MERSENNE

Marin Mersenne (1588-1648), ou *Marinus Mersenius*, appartenait à l'ordre religieux des Minimes. Érudit, philosophe et mathématicien, il a défini les nombres qui portent son nom. Ils sont de la forme $2^p - 1$. Certains parmi eux sont des nombres premiers. Pour ce faire, p oit lui-même être un nombre premier, cette condition étant nécessaire, mais pas suffisante. Les premiers nombres de Mersenne premiers sont 3 (2^2-1), 7 (2^3-1), 31 (2^5-1), 127 (2^7-1)... Mersenne a calculé (avec quelques erreurs) de tels nombres premiers jusqu'à l'exposant 257. Depuis, c'est la course au plus grand nombre de Mersenne premier, le dernier en date étant pour p = 82 589 933. Avec ses 24 862 048 chiffres, le nombre obtenu est aussi le plus grand nombre premier connu.

Marin Mersenne, un religieux à la culture encyclopédique.

un ordinateur puissant sont nécessaires. Pour cette raison, le *Gimps* distribue les calculs. On peut faire mieux!

Pour ce faire, une première approche consiste à construire une suite basée sur la représentation en base 10 avec, par exemple, $a_{n+1}=10a_n$, et a_0=7,3327334517988679. On obtient 7, 73, 733, 7333, 73327, 733273... une suite certes de nombres premiers, mais qui s'arrête vite, faute de termes de cette forme qui soient plus grands. C'est l'une des quelques suites connues et la plus étendue. Une autre base bien supérieure à 10, mais de taille fixe, sera forcément prise en défaut, notamment à cause de l'écart entre les nombres premiers qui croît rapidement.

Avec une fonction qui croît plus rapidement, comme n^n on obtient de meilleurs résultats, par exemple avec c=0,26558837294314339089712945366546... et $a_n = \lfloor cn^n \rfloor$. Elle s'arrête au bout de 19 termes, ici de a_3 à a_{22}. C'est la meilleure qui a été trouvée. Les premiers nombres premiers a_n sont: 7, 67, 829, 12391, 218723, 4455833, 102894377, 2655883729... Et le dernier: 1551723179991864497606172809.

Encore une fois, et pour les mêmes raisons, le procédé cesse de fonctionner au bout d'un moment. La méthode (*voir l'encadré page suivante*) est fondée sur un programme personnel.

Dans la seconde approche, on considère des formules du type de Mills, celle de Wright étant écartée, car elle croît trop vite. Le problème devient alors de trouver une fonction qui croit suffisamment lentement pour produire une suite de premiers de longueur arbitraire.

Prenons la suite $a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1$, dite de Sylvester (A000058 dans le catalogue OEIS, l'encyclopédie en ligne des suites de nombres entiers). Cette suite commence ainsi, avec a_0=2: a_n = 2, 3, 7, 43, 1807, 3263443, 10650056950807... Tous ne sont pas des nombres premiers (1807=13 × 139), mais étonnamment, la somme des inverses de ces termes 1/2+1/3 + 1/7+1/43+ 1/1807+1/3263443... est égal à 1. On peut ensuite se demander si l'on peut trouver un a_0 non plus entier, mais réel, qui produise des nombres premiers. Il suffirait d'utiliser la fonction «partie entière» $\lfloor x \rfloor$. La réponse est oui.

Avec a_0=1,6181418093242092, a_n=2, 3, 7, 43, 1811, 3277913, 10744710357637... La croissance est bien inférieure à celle de la formule de Mills et *a fortiori* à celle de Wright. Chaque terme a environ deux fois la taille du précédent, ce qui conduit tout de même à a_{14} = 9,838... × 10^{1667}.

Peut-on choisir l'exposant dans la formule précédente de sorte que la croissance soit encore plus lente? Oui, grâce au recuit simulé, on trouve assez rapidement ceci: si a_0=43,80468771580293481... et en utilisant l'arrondi de x noté $\{x\}$, on obtient $S_n=\{a_n\}$ et $a_{n+1}=a_n^{5/4}$. C'est maintenant la suite A323176 du catalogue OEIS: S_n=113, 367, 1607, 10177, 102217...

Cela semble fonctionner! Faisons mieux avec un exposant plus petit et un a_0 choisi soigneusement. Par exemple, si $a_{n+1} = a_n^{11/10}$ et a_0=100000000000000000000000000000049,31221074776345... on obtient la suite ci-dessous:

100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 049
158 489 319 246 111 348 520 210 137 339 236 753
524 807 460 249 772 597 364 312 157 022 725 894 401
3 908 408 957 924 020 300 919 472 370 957 356 345 933 709
70 990 461 585 528 724 931 289 825 118 059 422 005 340 095 813
3 438 111 840 350 699 188 044 461 057 631 015 443 312 900 908 952 333
48 972 469 000 420 009 426 555 707 142 502 303 667 155 036 417 8496 540 501... >

BIBLIOGRAPHIE

D. FRIDMAN *ET AL.*, A prime-representing constant, *The American Mathematical Monthly*, vol. 126, pp. 70-73, 2019.

Le plus grand nombre premier connu: http://bit.ly/82589933

Le site de Simon Plouffe: http://plouffe.fr

L'OEIS: https://oeis.org/

http://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/people/Abb.4 fromH Loeffel, Blaise Pascal, Basel: Birkhäuser 1987.DSB 9, 316-322.