

Un dino au sang chaud

L'analyse tomographique d'un fossile montre que certains dinosaures avaient un cœur proche de celui des mammifères et des oiseaux actuels.

Après quelques centaines de mètres, le prédateur abandonne la poursuite... et sa proie. Celle-ci, un herbivore, reprend son souffle : son cœur bat la chamade pour alimenter en oxygène les muscles sollicités pendant la fuite. Cette scène se passe il y a 66 millions d'années, à la fin du Crétacé, et met en scène deux dinosaures peu avant l'extinction du groupe. La communauté des paléontologues est partagée : ces reptiles avaient-ils le sang chaud, c'est-à-dire maintenu à température constante comme chez les mammifères et les oiseaux actuels, ou, à l'inverse, la température corporelle suivait-elle la température ambiante comme chez les reptiles ?

L'analyse au scanner d'un fossile mis au jour dans le Dakota du Sud

montre que certains dinosaures avaient un cœur plus proche de celui des mammifères et des oiseaux actuels que de celui des reptiles, auxquels ils sont apparentés. Cette





découverte étaye l'hypothèse d'animaux au sang chaud.

En Caroline du Nord, Dale Russell, Paul Fischer et leurs collègues ont acquis récemment le fossile d'un dinosaure du groupe des ornithopodes (leurs pieds ressemblaient à ceux des oiseaux) : cet animal (un théscélosaure) de quatre mètres de longueur pesait 300 kilogrammes. Outre le squelette, la roche où il a été découvert abritait également des tissus mous minéralisés dont seul un environnement pauvre en oxygène permet la conservation. De tels vestiges sont extrêmement rares !

Une tomographie du thorax a fourni des images de «tranches» de quatre millimètres qu'un ordinateur a combinées en une image tridimensionnelle. Les paléontologues y ont alors découvert les traces d'un cœur d'environ 2 000 centimètres cubes (deux litres), à quatre cavités et comportant une seule crosse aortique, comme le cœur des mammifères et des oiseaux ; le cœur des reptiles actuels a trois cavités et deux cosses aortiques (voir la figure).

Dans le cœur des reptiles, le sang riche en oxygène en provenance des poumons et le sang appauvri en oxygène, après avoir circulé dans tout l'organisme, se mélangent dans un ventricule unique qui expulse l'ensemble dans les deux cosses aortiques : la concentration en oxygène n'est jamais très élevée.

À l'inverse, le cœur des mammifères et des oiseaux est divisé en deux parties distinctes par une cloison interventriculaire qui empêche le sang riche en oxygène et le sang riche en dioxyde



La tomographie (a, les flèches indiquent les deux ventricules) du fossile d'un théscélosaure (b) vieux de 66 millions d'années montre que ces animaux avaient un cœur plus proche de celui des mammifères (celui d'un être humain est représenté en c) ou des oiseaux actuels que de celui des reptiles actuels (celui d'un amphibien est représenté en d). Le cœur des oiseaux et des mammifères a quatre cavités distinctes (deux oreillettes et deux ventricules) et une aorte qui alimente l'ensemble de l'organisme : le sang oxygéné en provenance des poumons (en rouge) et le sang pauvre en oxygène (en bleu) ne se mélangent pas. En revanche, le cœur de la plupart des reptiles (à droite) a trois cavités (deux oreillettes et un ventricule) et deux cosses aortiques qui distribuent un sang mêlé (en violet).

BRÈVES


Un GPS plus précis

Le Pentagone vient de supprimer la «disponibilité sélective» des signaux émis par les satellites de positionnement global GPS. Désormais, tout possesseur d'un récepteur GPS peut se localiser sur Terre avec la même précision que celle qui est utilisée par l'armée américaine pour guider ses missiles, soit dix mètres. Pourquoi cette générosité de la part des militaires américains ? Parce qu'ils ont mis au point un nouveau dispositif qui brouille ce signal haute précision en cas de conflit, région par région. Le projet de localisation européen, *Galileo*, ne devrait pourtant pas être abandonné, car la nécessité de rester indépendant des Américains est forte.

Alignement fortuit

Le télescope spatial *Hubble* vient de révéler un alignement de galaxies si parfait qu'il paraît irréal. La galaxie au premier plan est une spirale vue de face, située à 120 millions d'années-lumière.

La seconde est aussi une spirale, plus grosse, située à 20 millions d'années-lumière derrière la première. Cet alignement permet de voir le matériau sombre de la galaxie au premier plan, parce qu'il se découpe sur la galaxie arrière, un peu comme si l'on avait mis un écran clair derrière la première galaxie ; c'est une occasion unique d'étudier les nuages de poussières interstellaires, leur répartition et la quantité de lumière de la galaxie arrière qu'ils absorbent.




Du poisson pour nos ancêtres

Dans les roches des plages et dans les récifs coralliens des côtes de la mer Rouge, des géologues mexicains ont mis au jour des outils de pierre vieux de 125 000 ans. Ces découvertes indiquent que des hominidés occupaient le littoral pour exploiter les ressources marines. La sécheresse de l'époque aurait poussé nos ancêtres à s'établir au bord de la mer, où ils trouvaient de quoi se nourrir. C'est peut-être aussi à partir de cette côte de l'Érythrée que les hominidés ont migré de l'Afrique vers le Moyen-Orient, puis vers l'Asie.

Un iceberg géant

Le plus gros iceberg jamais observé s'est détaché, à la fin du mois de mars, de la calotte glaciaire de la mer de Ross, dans l'Antarctique. Grâce au satellite



européen ERS-2, qui mesure la température à la surface de la Terre et dont l'orbite passe par les pôles, on connaît sa taille : il mesure environ 300 kilomètres de longueur sur 40 de largeur. Le satellite

ERS-2 le suivra. D'après les déplacements des gros icebergs précédemment observés, celui-ci pourrait se déplacer à 30 kilomètres par heure.

Diagnostic de Creutzfeldt-Jakob

Quelles seront les conséquences, pour l'homme, de l'épidémie de vache folle qui frappe la Grande-Bretagne et d'autres pays d'Europe? On l'ignore encore, car on ne dispose d'aucun test diagnostic du variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, une forme de la maladie qui serait transmise à l'homme par les vaches contaminées. Le diagnostic définitif n'est établi qu'après analyse du cerveau des personnes décédées. Une méthode non invasive permettrait un diagnostic précoce : on disposerait ainsi de données épidémiologiques qui manquent pour évaluer la prévalence de cette maladie. Des Anglais ont montré que les personnes dont on pense qu'elles sont atteintes du nouveau variant de la maladie présentent sur une image IRM de leur cerveau deux petites zones du thalamus où le signal est anormalement intense. Ce pourrait être un critère diagnostique.

Le chromosome 21 séquencé

Il contient 225 gènes (le chromosome 22 séquencé récemment en contient 545). À eux deux, ces chromosomes portent 770 gènes, et le nombre total de gènes de notre patrimoine génétique a été revu à la baisse : on l'estime aujourd'hui à 40 000 (les premières estimations atteignaient plus du double). Maintenant que l'on connaît tous les gènes de ce chromosome, on devrait repérer plus facilement ceux des maladies génétiques liées au chromosome 21 et, par conséquent, les protéines impliquées. Et, bien sûr, nous devrions améliorer notre compréhension de la trisomie 21, où coexistent trois chromosomes 21 au lieu de deux.

de carbone de se mêler. Les mammifères et les oiseaux sont alimentés par un sang riche en oxygène qui autorise une récupération rapide après un effort.

Une autre question taraude les paléontologues : les dinosaures ont dominé la Terre pendant plus de 200 millions d'années alors que le théscélo-saure découvert est un des derniers dinosaures : il vivait un million d'années avant l'extinction de ces animaux. Le cœur à quatre cavités est-il un carac-

tère ancestral commun à tous les dinosaures, ou bien ce caractère a-t-il évolué parallèlement chez les ornithomorphes et dans un autre groupe de dinosaures, les théropodes (la famille du tyrannosaure), que l'on pense être les ancêtres des oiseaux actuels? Quelle que soit la réponse, l'existence de deux circulations complètement séparées a sans doute permis aux dinosaures un «style de vie» plus actif que celui des reptiles actuels.

Franchissement de stop

Un antibiotique assurerait une réexpression partielle de la dystrophine, la protéine qui manque aux personnes atteintes de myopathie de Duchenne.


Dès que l'on a découvert les antibiotiques et leur remarquable puissance antibactérienne, on a constaté que ces substances perturbent les bactéries de diverses façons. Ils sont notamment la cause de nombreuses erreurs de traduction, lorsque les gènes de la cellule s'expriment et qu'a lieu la synthèse des protéines. De cette

propriété qui contribue à tuer les bactéries, les biologistes ont fait une arme potentielle contre une maladie génétique grave, la myopathie de Duchenne.

Cette maladie est due à l'absence de dystrophine, une protéine qui assure l'architecture des cellules musculaires et les propriétés contractiles des muscles. Or, la gentamicine, appliquée sur des cultures de cellules où certains gènes ne s'expriment pas, déclenche la production des protéines manquantes. Dès lors il était intéressant de tester la gentamicine sur des souris mutantes qui ne fabriquent pas la dystrophine. On a constaté que, chez certaines de ces souris, le gène de la dystrophine s'exprime en présence de gentamicine. Les souris sensibles à l'action de la gentamicine retrouvent une certaine activité musculaire.

La myopathie de Duchenne résulte toujours de l'absence de dystrophine, mais la cause varie. Diverses anomalies génétiques, des délétions (le gène est amputé), des duplications ou des mutations, peuvent être responsables d'une absence de production de la précieuse protéine, ou de la production d'une protéine qui n'est pas fonctionnelle. En ce qui concerne les mutations, elles sont localisées de façon aléatoire dans le gène, ce qui aboutit parfois à l'apparition de codons stop, des séquences géniques qui indiquent à la machinerie cellulaire de production des protéines, l'endroit où chaque protéine s'arrête. Or, les souris chez qui le traitement par la gentamicine est efficace ont un gène de

la dystrophine entier et correct à ceci près qu'un codon qui devrait donner un acide aminé est muté en codon. La mutation qui fait apparaître un codon de terminaison entraîne un arrêt précoce de la traduction :



Lorsqu'un ribosome, l'usine de fabrication des protéines, rencontre, sur l'ARN de la dystrophine, un codon stop, il cesse de produire la protéine. La protéine tronquée est inactive. Or, la gentamicine, un antibiotique, favorise les erreurs que font les ribosomes. Ici, en «masquant» le codon stop, il permet la production d'une protéine entière, fonctionnelle. L'administration de gentamicine à des souris atteintes de myopathie assure une production de dystrophine suffisante pour restaurer partiellement l'activité musculaire.