




# Vision de la chaleur

ROLAND LEHOUCQ • JEAN-MICHEL COURTY

**Divers systèmes de vision – l'œil lui-même – évaluent avec efficacité le rayonnement thermique émis par les objets.**

Le rayonnement thermique émis par tout corps trahit sa température. Nos yeux et de nombreux systèmes de vision ou de détection sont capables, dans certaines situations, d'évaluer, à distance, la température des corps chauds. Toutefois, ils sont spécialisés pour certaines longueurs d'onde. Si l'on sait estimer la température d'un corps incandescent, car il rayonne beaucoup d'énergie sous forme de lumière visible, on doit, pour les objets moins chauds, détecter le rayonnement infrarouge qu'il dégage. Certains animaux, par exemple certains serpents ou même des coléoptères, détectent le rayonnement infrarouge pour repérer à la fois leurs prédateurs et leurs proies.

Comment peut-on définir le rayonnement thermique ? Tout corps, dont la température est supérieure au zéro absolu, émet des ondes électromagnétiques dans toute la gamme des longueurs d'onde. Seule la température détermine les caractéristiques de ce rayonnement. Plus précisément, la loi de Stefan stipule qu'un corps chaud rayonne une puissance électromagnétique proportionnelle à la puissance quatrième de la température (mesurée en kelvins). L'énergie se répar-

tit dans toutes les longueurs d'onde ; elle présente un maximum pour une longueur d'onde particulière. La loi de Wien stipule que le produit de la température par la longueur d'onde qui définit ce « pic d'émission » est constant et vaut  $2\,896$  micromètres kelvins. Ainsi, un morceau de fer à  $700$  kelvins ( $427^\circ\text{C}$ ) émet son maximum d'énergie thermique pour une longueur d'onde de  $4,1$  micromètres, trop éloignée dans l'infrarouge pour que la partie de son rayonnement émise dans les longueurs d'onde visibles nous soit perceptible. En revanche, quand la température de ce morceau de fer est égale à  $1\,400$  kelvins ( $1\,127^\circ\text{C}$ ), son pic d'émission est à une longueur d'onde de  $2,1$  micromètres, plus proche du rouge (la plus grande longueur d'onde visible est vers  $0,8$  micromètre) : nous le voyons alors luire. À  $1\,400$  kelvins, la masse de fer rayonne 16 fois plus d'énergie qu'à  $700$  kelvins. Cet exemple montre qu'un corps émet l'essentiel de son rayonnement thermique pour une longueur d'onde d'autant plus petite qu'il est chaud.

Le Soleil, notre principale source de lumière, émet son maximum de puissance dans la partie jaune du spectre visible (pic vers  $0,5$  micromètre). Ceci correspond à une température de  $5\,770$  kelvins. Les braises d'un feu de bois émettent pour l'essentiel dans l'infrarouge, pour des longueurs d'onde proches de  $3$  micromètres. Leur maximum d'émission est toutefois suffisamment proche du domaine visible (de  $0,4$  à  $0,8$  micromètre) pour qu'elles émettent aussi un peu de lumière rouge. Elles cessent d'émettre de façon perceptible à nos yeux lorsque leur température devient inférieure à  $500^\circ\text{C}$ . Caractérisé par une température de surface de  $25^\circ\text{C}$ , notre corps émet lui aussi uniquement dans le domaine infrarouge (vers  $10$  micromètres). C'est pourquoi nous sommes invisibles dans l'obscurité.

## DE LA LUMIÈRE À LA TEMPÉRATURE

Lorsqu'un corps chaud émet beaucoup de rayonnement, on peut en faire l'analyse spectrale, c'est-à-dire étudier la répartition de l'énergie dans les différentes longueurs d'onde. Celle-ci livre sa température. Deux situations se présentent. La première – la plus simple – est celle où il est possible de détecter le pic d'émission. Une fois celui-ci situé avec précision sur l'échelle des longueurs d'onde, la loi de Wien dicte la température du corps émetteur. De nombreux appareils de mesure exploitent ce principe. C'est ainsi que les physiciens ont, par exemple, déterminé la température de la photosphère du Soleil. Nous ne faisons pas autre chose, quand, apercevant un morceau de fer chauffé à blanc, nous concluons qu'il est proche de son point de fusion (vers  $1\,800$  kelvins).

Toutefois, la détection du pic d'émission est souvent impossible : on est alors dans la seconde situation, où l'on cherche à évaluer une température en l'absence d'un pic d'émission. Ainsi, nous-mêmes, ou plutôt nos yeux, ne détectent pas les pics d'émission quand ils se trouvent en dehors du domaine visible.

La détermination des longueurs d'onde émises dans le domaine visible, c'est-à-dire de la « couleur perçue », s'impose alors. Avec un peu d'expérience, nous pouvons apprendre à estimer la température d'un corps incandescent, dont la température est supérieure à  $500^\circ\text{C}$ . Le souffleur de verre et le forgeron sont des experts : ils maîtrisent l'art de déterminer la température des matériaux qu'ils travaillent ; celle-ci guide le façonnage.

Toutefois, la façon dont nos yeux fonctionnent limite notre capacité d'évaluation de la température aux seuls corps qui émettent un rayonnement intense. Notre vision, ainsi que celle de la plupart des animaux, est bien adaptée à la lumière solaire ; la sensibilité est maximale dans la gamme des longueurs d'onde où le Soleil rayonne le plus d'énergie. Quand la luminosité est suffisante, nous pouvons distinguer toutes les couleurs grâce à l'un des deux types de nos cellules visuelles, les cônes. Ces



Dessins de Bruno Vacaro

Un forgeron expérimenté est capable d'évaluer à l'œil nu la température du métal qu'il travaille. Il doit le marteler à la bonne température pour être certain d'obtenir un matériau de qualité.

cellules existent sous trois formes, sensibles à des longueurs d'onde voisines correspondant aux couleurs rouge, verte et bleue. Les cônes ne sont plus activés lorsque la luminosité est trop faible. D'autres cellules visuelles, les bâtonnets, sensibles à toute la lumière visible prennent alors la relève, mais elles ne permettent plus de distinguer les couleurs. La nuit tous les chats sont vraiment gris.

## L'ÉVALUATION DE LA PUISSANCE


Lorsque la luminosité devient trop faible, l'analyse spectrale est inefficace : le fonctionnement de l'œil est une solution pour pallier cette insuffisance. Pour déterminer la température d'un corps, une meilleure stratégie consiste alors à évaluer la puissance du rayonnement émis, puis d'appliquer la loi de Stefan. Dans la plupart des situations – quand le corps n'est pas très chaud –, le pic d'émission se trouve dans le domaine infrarouge, domaine où l'on réalise la mesure pour obtenir une bonne sensibilité. Connaissant la géométrie et la nature du matériau émetteur, on détermine alors la température de façon précise. On peut aussi réaliser une thermographie, c'est-à-dire une carte de la répartition des températures dans l'espace (voir l'illustration en haut de la page 108). Les images des caméras thermiques sensibles au rayonnement infrarouge utilisées dans l'industrie sont de telles cartes. Ces caméras servent, par exemple, à la détection des pannes : un faux contact ou un court-circuit dans une installation électrique provoquent un échauffement anormal qu'une telle caméra met immédiatement en évidence ; elles servent aussi à repérer les composants défectueux sur les cartes électroniques, à optimiser le refroidissement des circuits intégrés.

Certains animaux aussi pratiquent la thermographie. C'est notamment le cas des crotales. Grâce à des capteurs logés

dans les fossettes loréales, entre les narines et les yeux, ces serpents repèrent leurs proies dans l'obscurité. La nuit, les petits animaux à sang chaud émettent plus de rayonnement thermique que le sol, car leur température est supérieure. Creuses, les fossettes loréales des crotales sont tapissées de nerfs sensibles au réchauffement provoqué par l'absorption de rayonnement infrarouge. Leur maximum de sensibilité se situe à une longueur d'onde égale à 10 micromètres, laquelle correspond au pic d'émission de proies dont la température corporelle est d'environ 30 °C. Ces récepteurs thermiques sont comparables à une chambre noire rudimentaire : le rayonnement infrarouge y pénètre par un petit trou pour former sur le fond de la cavité une image inversée de l'objet observé. L'image ainsi obtenue est trop floue pour permettre au serpent d'identifier la nature du corps chaud qu'il a repéré, mais suffit pour le viser. Avant de déclencher son attaque, il s'assure, grâce à son odorat, que la proie qu'il a dans son «viseur infrarouge» est vraiment intéressante.

Les animaux à sang froid sont les seuls à pouvoir déterminer sans difficultés la température en mesurant la puissance thermique. En effet, la thermométrie par échauffement, ou bolométrie, est limitée par deux facteurs : le rayonnement thermique émis par l'environnement proche du détecteur et la faible puissance émise par un corps chaud. Quand le rayonnement parasite est trop important, la source observée est noyée dans un bruit de fond. C'est pourquoi, les astronomes refroidissent leurs détecteurs à infrarouges avec de l'azote liquide, afin de réduire le rayonnement thermique propre à l'appareil, et ainsi améliorer la sensibilité de ses mesures. Les serpents n'ont pas ce problème : leur température étant inférieure à celle de leur proie, leur propre rayonnement ne crée pas de bruit de fond parasite.

La deuxième limitation tient à la faible intensité des puissances thermiques à mesurer. Puisqu'ils transforment le rayonnement reçu en chaleur, les bolomètres et autres systèmes sensibles aux infrarouges doivent être bien isolés, sinon la chaleur due à un faible rayonnement infrarouge est évacuée avant que la mesure n'ait été faite. Une fois encore, la nature a trouvé une solution à ce problème, notamment dans le cas de la *Melanophila acuminata*. Ce coléoptère d'en-



Les crotales ont des «viseurs infrarouges» : le rayonnement infrarouge émis par la proie forme une «image thermique» détectée par des récepteurs sensibles à ces signaux.

viron un centimètre de longueur repère un incendie à 20 kilomètres ! Cette spectaculaire acuité est vitale pour son espèce, puisque *Melanophila acuminata* ne s'accouple que près des feux de forêt. Ses œufs doivent être pondus dans du bois récemment brûlé, car ses larves sont incapables de survivre dans le bois vivant. *Melanophila acuminata* détecte les longueurs d'onde comprises entre 2,4 à 4 micromètres avec un maximum de sensibilité pour une longueur d'onde correspondant à la température de 880 °C, celle d'un feu de forêt.

Quelques millièmes de watt par centimètre carré pendant quelques millièmes de seconde suffisent à ses récepteurs. Une telle sensibilité est possible grâce à la dilatation : ses organes récepteurs sensibles à la chaleur sont en forme de cratère. Le fond est tapissé d'une centaine de structures en forme de dômes et l'intérieur est rempli d'un réseau très dense de filaments de cire reliant les dômes. Cette géométrie, qui ressemble à celle de la laine de verre, favorise une bonne isolation thermique des dômes qui sont chauffés par l'absorption du rayonnement infrarouge incident. Quand ils s'échauffent, leur dilatation déforme les dômes, ce qui active des cellules nerveuses sensibles à d'infimes déplacements (0,1 nanomètre seulement) !

Les situations où un être vivant ou une machine utilise la thermographie ou l'analyse spectrale sont variées. La vue, c'est la vie, et la vue, c'est la température !

**Roland LEHOUCQ** est astrophysicien au service d'astrophysique du CEA. **Jean-Michel COURTY** est physicien, chargé de recherche au CNRS.

**G. BRUHAT**, *Thermodynamique*, Masson, Paris, 1962.

**H. SCHMITZ, H. BLECKMANN**, *The photo-mechanic infrared receptor for the detection of forest fires in the beetle Melanophila acuminata*, in *J. Comp. Physiol.* vol. A 182, pp. 647-657, 1998.



Pour *Melanophila acuminata*, le temps des amours est arrivé : ce «couple» vient de détecter qu'au loin un incendie prépare le bois brûlé où la femelle déposera ses œufs.