


Psychologie

La magie opère aussi sur les autistes



Dick the Magician, avec l'aimable autorisation de Rick Gardner

Vos yeux suivent la balle lancée en l'air par le magicien de façon répétitive. Soudain, elle disparaît ! Vous jureriez l'avoir vue quitter la main du prestidigitateur. Pourtant, elle est restée cachée dans sa paume : vous avez été berné par le regard de l'illusionniste, qui suivait la balle fantôme. Les autistes étant moins sensibles à ces indices dits « sociaux », ici le regard, on supposait qu'ils se laisseraient moins facilement prendre à ce tour. Selon Gustav Kuhn, de l'Université Brunel, au Royaume-Uni, et de ses collègues, ce n'est pas le cas.

Quand ils ont montré à des adolescents, autistes ou non, une vidéo d'un magicien effectuant le tour, les premiers ont été plus enclins que les autres à prétendre avoir vu la balle en l'air avant qu'elle ne s'évanouisse. Selon G. Kuhn, ces résultats traduisent l'enseignement qu'ont reçu les autistes dans un établissement spécialisé, enseignement qui les incite à prendre en compte les indices sociaux (les regards, les gestes, les intonations de la voix). Cet enseignement semble efficace dans l'expérience présente, même si l'étude montre que les autistes continuent à avoir des difficultés à se concentrer et à focaliser leur attention au bon endroit au bon moment.

→ Loïc Mangin

G. Kuhn et al., *Psychological Science*, vol. 21(10), pp. 1487-1493, 2010

En bref

L'ORCHIDÉE SONNE L'ALARME

L'orchidée *Epipactis veratrifolia*, qui pousse en Turquie, est pollinisée par des syrphes, des mouches qui ressemblent à des guêpes. Or les larves de ces insectes se nourrissent de pucerons. Des biologistes ont montré que la fleur émet trois molécules que l'on retrouve... dans le bouquet d'odeurs libérées par les pucerons lorsqu'ils sont en danger ! Les mouches sont attirées par l'odeur, pondent leurs œufs sur la plante et se chargent de pollen. Elles le transportent ensuite vers d'autres orchidées.

TÉLÉPRÉSENCE 3D

Une vue holographique et en temps réel d'une scène qui se déroule à des milliers de kilomètres de vous ? Cette idée, exploitée dans le film *La guerre des étoiles*, datant de 1977, n'est plus de la science-fiction. L'équipe de Nasser Peyghambarian, de l'Université de l'Arizona, a fait la démonstration d'un dispositif qui, via une liaison Ethernet, crée à distance et dans un polymère photoréfractif des images holographiques multichromes rafraîchies toutes les deux secondes.

LA PROTÉINE DU SONAR

Les chauves-souris et les cétacés à dents (cachalot, orques, dauphins, etc.) émettent des ultrasons qui se réfléchissent sur les objets de l'environnement. Bien que ces espèces soient éloignées sur l'arbre de l'évolution, leurs sonars mettent en jeu une même protéine des cellules ciliées de l'oreille interne, l'organe de la perception auditive, la prestine. Cette molécule assure la perception des hautes fréquences, montrent deux équipes à Londres et à Shanghai. Selon la séquence des acides aminés, la fréquence sonore perçue par les cétacés à dents diffère.

Archéologie

Une technique de taille vieille de 75 000 ans

Sensation chez les préhistoriens : une technique de taille de pierres parmi les plus avancées, la retouche par pression, était pratiquée en Afrique du Sud depuis 75 000 ans, soit 55 000 ans plus tôt que ce que l'on pensait. En exerçant sur les bords de la pièce travaillée une pression avec la pointe d'un percuteur en os ou en pierre tendre, cette technique permet de détacher de petits éclats. Le tailleur obtenait ainsi des pointes de projectile bien affûtées.

Vincent Mourre, de l'INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) et deux collègues, Paola Villa et Christopher Henshilwood, ont étudié les pointes de projectile trouvées dans l'abri-sous-roche de Blombos, en Afrique du Sud. Fouillé depuis 1991 par Ch. Henshilwood, de l'Université de Bergen, en Norvège, cet abri est célèbre en raison des artefacts qui y ont été retrouvés. Il s'agit notamment de blocs d'ocre gravés de motifs géométriques et d'éléments



L'une des pointes de projectile retrouvées à Blombos, en Afrique du Sud, et façonnées par la technique dite de la retouche par pression.

de parure en coquillages marins percés, qui illustrent les capacités cognitives avancées des hommes les ayant fabriqués.

L'analyse des pointes de projectile de Blombos et l'expérimentation révèlent que la technique de retouche par pression était pratiquée par les occupants du site. Ils obtenaient ainsi des pointes en silicrète, roche siliceuse qui constituait leur matière première.

Les plus anciens témoignages de cette technique dataient jusqu'à présent du Solutrén, c'est-à-dire du maximum de la dernière glaciation, il y a 20 000 ans. En Amérique du Nord, la retouche par pression n'est apparue qu'il y a 11 000 ans.

→ François Savatier

V. Mourre et al., *Science*, vol. 330, pp. 659-662, 2010

Médecine

Un marqueur universel du cancer ?

Le récepteur d'une hormone sexuelle ne s'exprime que dans les tumeurs.


Le cancer est marqué par l'accumulation d'anomalies génétiques dans une cellule, qui se multiplie alors de façon désordonnée au point de former une tumeur. Cette dernière ne survit que si elle trouve les nutriments et l'énergie nécessaires à sa croissance : elle se développe donc avec son propre réseau de vaisseaux sanguins, indépendant du système vasculaire de l'organisme. Nicolae Ghinea, de l'équipe INSERM Institut Mondor de recherche biomédicale à l'Université Paris-Est de Créteil, et ses collègues ont identifié une molécule spécifique des cancers présente sur la paroi interne des vaisseaux sanguins tumoraux.

Cette molécule est le récepteur de l'hormone folliculostimulante ou FSH, nécessaire à la maturation des ovules chez la femme et à la production des spermatozoïdes chez l'homme. Les récepteurs de cette hormone ne sont présents normalement que sur les cellules cibles des ovaires et des testicules, et en très faible quantité dans les vaisseaux sanguins de ces organes.

Les biologistes ont recherché ce récepteur dans des biopsies de tumeurs pratiquées chez 1336 patients. Onze types de cancers ont été étudiés (prostate, sein, côlon, pancréas, vessie, rein, poumon, foie, estomac, testicules et ovaires) à des stades différents.

Résultat : le récepteur de la FSH est présent à la surface des cellules qui tapissent la paroi interne des vaisseaux sanguins tumoraux, mais absent du reste de l'organe. Et ce, pour tous les cancers étudiés. Les chercheurs ont en outre injecté à une souris une molécule qui se fixe spécifiquement sur ce « marqueur » et ont ainsi détecté la tumeur qu'elle portait. On a peut-être là un nouvel outil diagnostique, voire thérapeutique si l'on pouvait détruire la tumeur avec des agents antitumoraux se fixant sur le récepteur de la FSH.

→ Bénédicte Salthun-Lassalle

A. Radu et al., *The New England Journal of Medicine*, vol. 363, pp. 1621-1630, 2010

Tissu d'une tumeur de la prostate à un stade d'évolution précoce. Le vaisseau irriguant cette tumeur exprime le récepteur de la FSH (en rouge, et en bleu les noyaux des cellules cancéreuses).

22 POUR CENT : c'est la baisse du taux de mortalité par cancer chez les hommes en France entre 1983-1987 et 2003-2007. Chez les femmes, elle est de 14 pour cent.

Biologie animale

Comment l'abeille devient reine

On comprend pourquoi la gelée royale fait que certaines larves deviennent des reines et d'autres des ouvrières.

De grande taille, lente à se mouvoir, la reine d'une colonie d'abeilles passe l'essentiel de sa vie – quatre à cinq ans – à pondre, choyée par sa cour. Les

ouvrières, au contraire, petites, agiles et stériles ne vivent que quelques semaines. Pourtant, la reine et les ouvrières sont génétiquement identiques. Comment un même génome peut-il produire des individus si différents ? Une équipe germano-australienne vient d'éclaircir les mécanismes moléculaires en jeu.

On savait l'alimentation en jeu : les larves élevées comme de futures reines et la reine survivante (après avoir éliminé ses rivales) sont nourries exclusivement de gelée royale. Les autres larves, qui deviendront des ouvrières, sont nourries surtout de miel et de pollen.

En 2008, l'équipe de Sylvain Forêt et Ryszard Maleszka, de l'Université de Canberra, en Australie, a montré que la suppression d'une enzyme, l'ADN méthyle-

transférase, chez des larves nourries pour devenir ouvrières, fait qu'elles se développent en reines fécondes : supprimer cette enzyme a le même effet que la gelée royale. Cette enzyme étant nécessaire à la méthylation de l'ADN, c'est-à-dire à l'ajout de groupes méthyle sur certaines bases (des cytosines) de l'ADN, la gelée royale apporte vraisemblablement des substances inhibant ce processus, dit épigénétique.

Supposant que les gènes ne s'expriment pas de la même façon chez la reine et les ouvrières, ces biologistes associés à un groupe du Centre allemand de recherche sur le cancer, à Heidelberg, ont séquencé les génomes de reines et d'ouvrières et identifié tous les sites méthylés de l'ADN. Ils ont observé que quelque 560 gènes

étaient méthylés différemment. La méthylation paraît réguler le type et la quantité des protéines produites chez une reine et chez une ouvrière.

Comment les enzymes de méthylation repèrent-elles les cytosines cibles parmi les dix millions de sites possibles chez l'abeille ? On l'ignore, mais un mécanisme expliquant les différences entre reines et ouvrières se dessine : la présence ou l'absence de gelée royale détermine différents profils de méthylation de leur ADN. En ajustant l'expression de certains gènes, ces profils donnent lieu à des caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales distinctes.

→ Jean-Jacques Perrier

F. Lyko et al., *PLoS Biology*, vol. 8, e1000506, 2010

Une reine et sa cour.