

2. La conjecture de Toeplitz est presque démontrée


Walter Stromquist a démontré en 1989 que si une courbe fermée simple du plan est *localement monotone*, alors elle possède nécessairement un carré inscrit.

Par définition, pour qu'une courbe soit localement monotone (a), on doit pouvoir associer, à chaque point M de la courbe, un système d'axes Oxy de façon qu'un petit morceau de la courbe autour de M soit tel que deux points de ce bout de courbe ne sont jamais sur une droite parallèle à l'axe Oy.

À l'exception des courbes fractales et de quelques courbes

bizarres, toutes les courbes envisagées en mathématiques sont localement monotones et donc le théorème de Stromquist démontre de manière presque définitive la conjecture de Toeplitz.

Le problème est qu'on ne sait pas se débarrasser du « presque » ! La courbe fermée simple (b) entourant le domaine en bleu est lisse en tous points, sauf au centre où la condition de monotonie locale n'est pas vérifiée. À moins d'un argument particulier, on ne peut lui appliquer le théorème de Stromquist et on n'est donc pas certain qu'elle possède un carré inscrit.



Malheureusement certaines courbes fractales ne sont pas localement monotones, et la conjecture n'est donc pas démontrée pour cette famille de courbes. On obtient une courbe pour laquelle la conjecture n'est pas prouvée en mettant bout à bout des morceaux de la courbe du flocon de von Koch de façon à obtenir une courbe non symétrique.

Le flocon de von Koch lui-même est un exemple intéressant : sa symétrie assure qu'il comporte au moins un carré inscrit. Une étude graphique empirique de Francesco De Comit , au Laboratoire d'informatique fondamentale de Lille, sugg re fortement que le flocon comporte une infinit  de carr s inscrits, mais pour l'instant le r sultat n'est pas  tabli rigoureusement (voir la figure 3).

Errare humanum est...

Certaines erreurs sont des pi ges dans lesquels nous sommes irr sistiblement attir s. Un joli pi ge est   l'origine de plusieurs r sultats faux, heureusement rep r s depuis leur publication. Une id e naturelle pour d montrer le cas g n ral consiste   approcher une courbe ferm e simple C par une suite $C_0, C_1, C_2, \dots$ de courbes r guli res (par exemple des polygones) pour lesquelles on sait qu'il y a un carr  inscrit. Partant de cette

suite de carr s [qui n'est pas n cessairement convergente], on sait en extraire une suite convergente de carr s (on ne retient que certains des carr s de la suite). Le fait que les courbes C_i convergent vers C assure que le carr  limite de la suite convergente extraite est un carr  inscrit dans C .

La conjecture est-elle d montr e ? H las non, car, sauf argument suppl mentaire, rien n'interdit   la suite extraite de carr s de converger vers un carr ... de c t  nul.  videmment, cela n'a aucun int r t, car m me si on ne l'a pas pr cis  dans l' nonc  de la conjecture, il est clair qu'on a exclu le cas des carr s inscrits r duits   un seul point. De nombreuses tentatives de d monstration de la conjecture de Toeplitz et plusieurs d monstrations de cas particuliers exploitent l'id e ici d crite en s'arrangeant pour que le carr  limite ne se r duise pas   un point.

La situation aujourd'hui est donc ind termin e, et il n'est pas exclu que les courbes ferm es simples du plan qui contiennent les quatre coins d'un carr  constituent un sous-ensemble « maigre » de l'ensemble de toutes les courbes ferm es simples. La notion de « sous-ensemble maigre » (allez voir la d finition de Wikip dia...) exprime l'id e de raret  dans le contexte topologique des ensembles de courbes continues. Elle

a une certaine analogie avec le fait que les nombres rationnels (rapports de deux entiers) sont rares dans l'ensemble des nombres r els. Il est amusant de constater que les cas pour lesquels on a d montr  la conjecture recouvrent la grande majorit  des courbes que les math maticiens envisagent, mais que cette partie pourrait malgr  tout  tre infime (« maigre »).

L'apparente contradiction tient   ce que les math maticiens  tudient en priorit  les courbes r guli res et que celles-ci ne sont pas repr sentatives des courbes qu'on rencontrerait si on les choisissait au hasard.

La situation est assez analogue   celle des nombres r els calculables, nombres pour lesquels il existe un algorithme qui en  num re ind finiment les d cimales. Les nombres calculables constituent une partie infime des nombres r els (c'est un ensemble qui a autant d' l ments qu'il y a d'entiers, alors qu'il y a plus de nombres r els que d'entiers), ce qui n'emp che pas qu'il a fallu attendre Alan Turing pour r aliser en 1936 qu'il existait des nombres non calculables et en d signer un !

  d faut de faire avancer directement l' nigme r calcitrante de Toeplitz, on tente de comprendre ce qui se passe dans des situations math matiques proches. Que dire des rectangles, des triangles, des losanges ?