

Pour décrire ces bandes, ils ont proposé le terme de « rivières atmosphériques ».

À peu près au même moment, un nouveau système d'imagerie micro-onde embarqué sur un réseau de satellites a mesuré pour la première fois la répartition atmosphérique de la vapeur d'eau. Cette dernière se concentre en longs et étroits couloirs mobiles, qui s'étendent en général de l'air chaud et humide des tropiques jusqu'aux régions plus sèches et plus froides des latitudes supérieures, comme dans les simulations précédentes. De plus, les données montraient que ces coulées de vapeur apparaissent et se dissipent en quelques jours à quelques semaines.

Les météorologues ont vite compris l'importance de ces découvertes. Ils ont multiplié les observations pour caractériser les rivières atmosphériques. Des radars pointés vers le ciel et des systèmes de mesure de la vitesse et de la direction du vent ont été mis en place pour les surveiller. Un programme de la NOAA a été consacré à l'étude du comportement des rivières atmosphériques lorsqu'elles pénètrent au-dessus des continents.

Grâce aux données récoltées, les prévisionnistes savent mieux reconnaître ce phénomène et prévoir son arrivée sur les côtes. Ces dernières années, certaines tempêtes ont été identifiées plus d'une semaine avant de toucher terre. Ce progrès donne en particulier plus de temps aux services de secours pour s'organiser.

Une grande inondation par siècle ?

Malgré une meilleure compréhension scientifique du phénomène, peu de choses sont faites pour limiter les dangers. Les inondations californiennes de 1861-1862 sont pratiquement oubliées aujourd'hui. Depuis un siècle, habitations, industries et exploitations agricoles se sont multipliées sur ces mêmes plaines inondables qui furent submergées il y a 150 ans. Les résidents ignorent ou négligent les risques. Mais, devant l'accumulation d'indices suggérant la possibilité d'une prochaine tempête de grande ampleur, l'inquiétude grandit chez les météorologues.


Pourquoi les spécialistes pensent-ils qu'une nouvelle crue importante pourrait se déclencher d'ici quelques années ? Certains chercheurs ont étudié l'occurrence et la fréquence des inondations en Californie

LES GRANDES INONDATIONS EN CALIFORNIE

Des inondations massives ont frappé la Californie tous les 200 ans environ, d'après les analyses des dépôts de sédiments laissés par les torrents en quatre lieux éloignés les uns des autres. Les différentes méthodes de datation utilisées ont des marges d'erreur différentes, mais les résultats sont assez bien alignés. Si cette régularité correspond à la réalité, la Californie pourrait être bientôt confrontée à une nouvelle catastrophe ; la dernière inondation importante date de 1861 et avait laissé Sacramento sous les eaux pendant six mois (photographie ci-dessous).



David Joslyn Collection/Center for Sacramento History



au cours des deux derniers millénaires. Ils ont passé au crible les données archivées dans les sédiments des fonds lacustres, des plaines inondables, des marais et des bassins sous-marins de la région. Lorsqu'elles s'écoulent, les eaux d'inondation emportent de l'argile, du limon et du sable. Quand les flots ralentissent en atteignant une plaine inondable, un marais, un estuaire ou l'océan, ils libèrent leur charge de sédiments : d'abord les gros graviers, puis les sables, enfin les limons et les argiles qui se déposent sur le fond. La nature reprend ses droits après chaque crue et, au bout d'un certain temps, les dépôts d'inondation sont enfouis sous de nouveaux sédiments laissés par les écoulements normaux.

Les chercheurs ont extrait des carottes verticales de ces sédiments, ont analysé les couches préservées et ont daté les différents événements. Par exemple, des dépôts d'inondation ont été trouvés dans les marais littoraux du pourtour de la baie de San Francisco, dans le Nord de la Californie. Typiquement, les eaux fluviales ne déposent que de minces traces des éléments les plus fins (des argiles et des limons). Les flots plus vigoureux des crues importantes charrient des particules plus grosses et déposent des couches plus épaisses et plus grossières. On peut dater ces couches de sédiments à l'aide de la méthode de la datation au carbone 14,

qui, dans cette application, a une précision d'une centaine d'années. Une étude des carottes des marais par l'un d'entre nous (Lynn Ingram) et la géographe Frances Malamud-Roam a révélé des dépôts liés à des inondations massives vers 1100, 1400 et 1650. Toutefois, il est difficile de distinguer une couche correspondant à l'épisode de 1861-1862, car l'extraction hydraulique d'or dans les contreforts de la Sierra Nevada au cours de la décennie précédant et suivant les inondations a déplacé de grands volumes de limon et de sable. Cela a effacé les traces qu'auraient pu laisser les crues.

Les crues du passé enregistrées dans les sédiments

Des carottes de sédiments récupérées dans la baie de San Francisco elle-même indiquent qu'en 1400, la baie s'est emplie d'eau douce (comme ce fut le cas en 1861-1862), traduisant une crue exceptionnelle.

Les géologues ont trouvé davantage d'indices dans le Sud de la Californie, où vivent deux tiers des 38 millions d'habitants de l'État, le long de la côte de Santa Barbara. Des sédiments se déposent sur le fond marin tous les printemps (formant une couche claire contenant des diatomées, des

micro-algues unicellulaires) et à nouveau en hiver (formant une couche sombre de limon). Les eaux profondes de la baie étant pauvres en oxygène, il n'y a pas d'animaux qui vivent sur le fond, remuent le sol et s'y enfouissent. Les couches annuelles de sédiments sont restées intactes pendant des millénaires. Les carottes de sédiments révèlent six grandes inondations distinctes, qui se traduisent par d'épaisses couches grises de limon correspondant aux années 212, 440, 603, 1029, 1418 et 1605. Les trois dates les plus récentes sont compatibles avec les dates approximatives de 1100, 1400 et 1650 indiquées par les dépôts des marais autour de la baie de San Francisco; cela confirme que des inondations généralisées ont bien lieu régulièrement à quelques siècles d'intervalle.

La couche la plus épaisse laissée par des inondations dans le bassin de Santa Barbara correspond à un dépôt de 1605. À quelques kilomètres au large, ces sédiments font cinq centimètres d'épaisseur. Les inondations de 440 et de 1418 ont laissé des couches de plus de 2,5 centimètres. C'est à comparer avec les couches de six et deux millimètres que l'on trouve vers le haut de la carotte, et qui ont été déposées par les tempêtes de 1958 et 1964, parmi les plus importantes du siècle dernier.

Des traces d'énormes inondations ont aussi été trouvées à environ 250 kilomètres

Un phénomène qui touche aussi l'Europe

Que l'humidité de l'atmosphère soit transportée des tropiques vers les pôles par un petit nombre de « rivières » étroites a été une réelle découverte de la fin des années 1990, sans doute facilitée par les nouveaux moyens d'observation de la Terre.

En revanche, il est moins étonnant que ce transport soit lié aux cyclones extratropicaux, ou dépressions des latitudes moyennes. C'est en effet aux bords d'un tel cyclone – dans son front – que se concentre l'eau atmosphérique et que sont créés des vents transversaux très forts. Le cyclone est donc responsable de la formation d'une bande atmosphérique qui transporte l'humidité rapidement, à de grandes distances. C'est ce mécanisme bien connu qui crée les tempêtes et les pluies sous nos latitudes. Mais si le bord du cyclone arrive à puiser

dans le réservoir d'air très humide que représentent les régions tropicales, la quantité d'eau transportée peut être colossale.

Dans l'hémisphère Nord, il existe deux principales régions où se forment et évoluent des cyclones extratropicaux; ce sont des régions tellement importantes pour le climat que les scientifiques les ont nommées *stormtracks*, ou « rails des dépressions » en français. Il s'agit de la région du Pacifique, dont traite l'article de M. Dettinger et L. Ingram, et de la région euro-atlantique, qui nous concerne tout particulièrement.

Ainsi, la région atlantique se prête aussi bien que la région du Pacifique à une analyse en termes de rivières atmosphériques. En 2011, David Lavers, de l'Université de Reading, en Angleterre, et ses collègues en ont établi le lien avec des épisodes d'inon-

dations en Grande-Bretagne. En effet, les dix plus graves inondations des 40 dernières années, y compris celle de 2009 dans le Nord-Ouest de l'Angleterre, sont imputables à des rivières atmosphériques. D. Lavers et Gabriele Villarini ont par la suite élargi l'analyse à toute l'Europe et, là aussi, établi un lien entre rivières atmosphériques et précipitations extrêmes.

Ils ont pu mettre en évidence qu'au moins la moitié des plus intenses épisodes de précipitation des 30 dernières années – surtout en hiver – sont associés à des rivières atmosphériques. Les régions les plus concernées sont celles de la partie occidentale du continent : la péninsule ibérique, la France, la Grande-Bretagne et la Scandinavie. Mais on a aussi observé des filaments d'humidité pénétrant dans le continent

et provoquant des précipitations intenses sur les reliefs. Un exemple notable est la tempête Lothar qui a dévasté de nombreuses régions le 26 décembre 1999.

Ces épisodes sont aussi déterminés par des conditions atmosphériques de grande échelle qui sont bien connus des climatologues. Typiquement, les fortes précipitations dans l'Europe du Sud ont lieu durant des phases négatives de la NAO (l'Oscillation Nord-Atlantique) et, dans l'Europe du Nord, au cours de sa phase positive. L'influence des rivières atmosphériques semble porter davantage sur l'intensité des pluies que sur leur probabilité d'occurrence.

Fabio D'Andrea

Laboratoire
de météorologie dynamique,
Institut Pierre Simon Laplace,
École normale supérieure, Paris