


## Une infinité de solutions infinies

**L**a méthode de composition des solutions donne aussi la démonstration qu'il existe des solutions au « problème infini des reines ». Ce problème consiste à placer des reines sur un échiquier infini de sorte qu'il y en ait une par ligne, une par colonne, une par diagonale parallèle à la droite  $y = x$ , et une par diagonale parallèle à la droite  $y = -x$ .

On procède progressivement : du problème torique des 5 reines, on prend la solution ayant une reine en son centre. On remplace chaque reine par la configuration elle-même (et l'on subdivise les autres cases). Cela donne une configuration convenable sur l'échiquier  $25 \times 25$ . De plus, cette configuration prolonge la première, en ce sens qu'on peut la voir comme l'addition de 20 nouvelles reines aux 5 reines initiales. On répète la même opération, ce qui prolonge la solution qu'on a sur un échiquier  $25 \times 25$  en une solution sur l'échiquier  $125 \times 125$ , puis sur un échiquier  $625 \times 625$ , etc. À chaque fois, les nouvelles configurations sont compatibles avec les précédentes, ce qui autorise à « passer à l'infini », c'est-à-dire à considérer simultanément toutes les reines qui sont déposées d'étape en étape. On a la solution recherchée.

La méthode donne ici une seule solution au problème infini des reines, mais on l'adapte pour montrer qu'il existe une infinité de solutions différentes à ce problème, que cette infinité de solutions n'est pas dénombrable et qu'elle est de même cardinal que le continu : il y a autant de solutions au problème infini des reines que de points sur une droite !



calcul. Ce dernier a tout de même duré dix mois et s'est terminé le 11 juillet 2009. Il a abouti à 22 317 699 616 364 044 (22 millions de milliards) solutions au problème des 26 reines. Depuis, le résultat a été confirmé par un calcul effectué par des Russes, mais le dénombrement des solutions n'a pas été effectué pour 27 reines ou plus.

Notons que si l'on cherche non pas une ou toutes les solutions, mais seulement quelques solutions, par exemple une centaine, alors d'autres méthodes de programmation sont envisageables. L'une d'elles consiste à placer au hasard une reine par colonne, ce qui donne une configuration très probablement incorrecte. On corrige

ensuite celle-ci en déplaçant les reines une à une, de telle sorte qu'à chaque déplacement, le nombre de conflits (c'est-à-dire de couples de reines en prise) diminue. On sait, par ce type d'algorithmes, trouver rapidement des solutions pour  $n = 100$  ou même  $n = 1\,000$ . Un algorithme quantique a aussi été présenté qui permettra peut-être de battre le record de  $n = 26$ ... le jour où l'on disposera d'ordinateurs quantiques de taille respectable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Ceux que la programmation du problème intéresse trouveront une multitude de programmes traitant des  $n$  reines, écrits dans une grande variété de langages de

programmation, sur le site internet [http://rosettacode.org/wiki/N-queens\\_problem](http://rosettacode.org/wiki/N-queens_problem).

À défaut de calculer le nombre exact de solutions pour tout  $n$ , on aimerait prouver que ce nombre augmente rapidement avec  $n$  (cela semble évident au vu des résultats connus de décompte jusqu'à  $n = 26$ ). Nous décrivons une telle méthode, mais nous envisagerons d'abord une variante du problème des  $n$  reines introduite par le mathématicien d'origine hongroise George Pólya (1887-1985).

Pólya imagine un échiquier  $n \times n$  dessiné sur un tore (la surface d'une chambre à air) (voir l'encadré page 81, A) et cherche des solutions au problème des  $n$  reines sur cet échiquier torique. Les contraintes sur les lignes et les colonnes ne changent pas. En revanche, pour les diagonales, cela se complique, car les diagonales se rejoignent désormais, comme si le bord droit était collé au bord gauche et le bord du haut au bord du bas (selon un principe souvent utilisé dans les jeux vidéo). Par conséquent, une configuration résolvant le problème des  $n$  reines sur l'échiquier normal n'est plus nécessairement une solution sur l'échiquier torique (voir les échiquiers B et C).

## Des reines sur un échiquier torique

Pólya a établi qu'il ne pouvait exister de solutions à ce problème que si  $n$  est de la forme  $6m + 1$  ou  $6m - 1$  pour un certain entier  $m$ . Le nombre de solutions est donné par une suite  $T(n)$  dont les premiers termes non nuls sont :  $T(5) = 10$ ,  $T(7) = 28$ ,  $T(11) = 88$ ,  $T(13) = 4\,524$ ,  $T(17) = 140\,692$ .

Propriété intéressante : si l'on dispose d'une solution torique et qu'on en pave tout le plan en utilisant le pavage habituel du plan par un carré, on obtient un dessin dont tout carré extrait de taille  $n \times n$  est encore une solution torique du problème des  $n$  reines (voir l'échiquier D).

L'intérêt des solutions toriques est surtout qu'on peut les exploiter pour construire automatiquement une multitude de grandes solutions à partir de quelques petites. La méthode est visuelle : on prend une solution du problème plan des  $n$  reines (par problème plan, nous entendons le

problème habituel) et l'on remplace dans cette solution chaque reine par une solution du problème torique des  $m$  reines. Cela donne une configuration de reines sur l'échiquier de côté  $n \times m$  qui est une solution au problème plan des  $n \times m$  reines (les menaces qui auraient pu se produire en diagonale entre les différentes copies de la solution torique sont évitées par les diagonales allongées de l'échiquier torique).

## Le nombre de solutions croît exponentiellement

La méthode de composition permet d'établir que le nombre de solutions au problème des  $n$  reines augmente exponentiellement avec  $n$ , ce que l'on a constaté jusqu'à  $n = 26$ , mais qu'il est bon de démontrer rigoureusement pour  $n$  tendant vers l'infini.

Voici un exemple de raisonnement. Puisqu'il y a 10 solutions au problème torique des 5 reines, en les combinant de toutes les façons possibles, l'une quelconque des 10 avec l'une quelconque des 10, on obtient 100 solutions au problème des 25 reines. Il est facile de s'assurer qu'elles sont différentes. En recommençant à partir de ces 100 solutions au problème des 25 reines, on obtient 1 000 solutions au problème des 125 reines, puis 10 000 solutions au problème des 625 reines, et, plus généralement,  $10^m$  solutions au problème des  $5^m$  reines. Pour les entiers  $n$  de la forme  $5^m$ , on a donc  $2^n$  fois plus de solutions que de nombre de reines. En partant de  $T(7) = 28$ , on aurait obtenu  $28^n$  solutions au problème des  $7^n$  reines, soit  $4^n$  fois plus de solutions que de reines.

On a bien une démonstration que le nombre de solutions augmente très vite lorsque le nombre de reines est une puissance de 5. En fait, le nombre de solutions comparé au nombre de reines semble croître bien plus vite encore que ne l'indique notre démonstration.

Notons, avant d'en venir aux conjectures, que la méthode décrite permet de concevoir une solution sur l'échiquier infini : du problème torique des 5 reines, on prend la solution présentant une reine au centre et on la combine indéfiniment

avec elle-même, ce qui conduit à une solution (ayant une reine sur chaque horizontale, chaque verticale et même chaque diagonale) du plan infini (voir l'encadré page 82).

La conjecture qui semble la plus probable est que si l'on note  $R(n)$  le nombre de solutions au problème des  $n$  reines, alors  $\log R(n)/(n \log n)$  tend, quand  $n$  tend vers l'infini, vers une constante qui vaut à peu près 0,44438... Si c'est vrai, cela signifie que  $R(n)$  augmente aussi vite que  $n^{0,44438n}$  : c'est beaucoup plus rapide que ce que nous avons su démontrer avec la méthode des solutions toriques de Pólya.

Signalons que certains mathématiciens se sont fait piéger en utilisant la méthode de composition. Ils ont pensé que l'on pouvait remplacer les reines de la solution plane par des solutions différentes du problème torique, ce qui est faux. La démonstration des minoration obtenues est donc fautive, bien que ces minoration soient reproduites dans divers articles, dont celui de Jordan Bell et Brett Stevens de 2009, très souvent cité (voir la bibliographie), où le *Theorem 2* n'est en réalité qu'une conjecture.

## D'autres jeux

Les échecs sont un jeu de raisonnement et intéressent donc de nombreux mathématiciens. Cependant, les problèmes d'échecs semblent un peu trop liés aux règles précises du jeu lui-même. Aussi les mathématiciens se sont-ils amusés à concevoir des énigmes combinatoires plus pures, tels le problème des  $n$  reines ou le tout aussi populaire problème du parcours du cavalier (faire circuler un cavalier de telle façon qu'il passe par chaque case de l'échiquier une fois exactement) qui a passionné Euler. Ce ne sont pas les seules. Les livres de John Watkins ou l'énorme mémoire gratuit (en anglais et en tchèque !) de Václav Kotěšovec en mentionnent un grand nombre (voir la bibliographie). Ces problèmes ont stimulé le développement de la théorie des graphes et resteront longtemps une source précieuse de défis informatiques et mathématiques.

## L'AUTEUR



**J.-P. DELAHAYE** est professeur émérite à l'université de Lille et chercheur

au Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille (CRISTAL).

## BIBLIOGRAPHIE

R. Spallek, *The world record by FPGAs*, 2015 : <http://queens.inf.tu-dresden.de/?n=0&l=en>

Rosetta Code, *N-queens problem*, 2015 : <http://rosettacode.org/wiki/N-Queens>

V. Kotěšovec, *Non-attacking chess pieces*, 2013 (téléchargeable sur le site <http://www.kotesovec.cz/>).

J. Bell et B. Stevens, *A survey of known results and research areas for n-queens*, *Discrete Mathematics*, vol. 309(1), pp. 1-31, 2009 (attention, *Theorem 2* n'est en fait qu'une conjecture).

J. J. Watkins, *Across the Board : The Mathematics of Chessboard Problems*, Princeton University Press, 2007.

I. Rivin et al., *The n-queens problem*, *Amer. Math. Monthly*, vol. 101(7), pp. 629-639, 1994 (attention, le théorème 2 et son corollaire sont faux).

P. Campbell, *Gauss and the eight queens problem : A study in miniature of the propagation of historical error*, *Historia Mathematica*, vol. 4(4), pp. 397-404, 1977.



Retrouvez la rubrique  
Logique & calcul sur  
[www.pourlascience.fr](http://www.pourlascience.fr)

## SCIENCE &amp; FICTION

# Quel animal roule comme Sonic et BB-8 ?

*L'homme a inventé la roue, mais le principe semble beaucoup moins répandu dans la nature. À quelques exceptions près, les animaux qui roulent sont tous imaginaires.*

Roland Lehoucq et Jean-Sébastien Steyer. Illustration : Marc Boulay

**L**e *hoopsnake* (serpent-cerceau) est l'une des plus fameuses bestioles du folklore américain du début du XIX<sup>e</sup> siècle. Selon la légende, ce serpent pouvait, à la manière de l'Ouroboros de la mythologie grecque, attraper sa queue avec sa gueule pour former un anneau lui permettant de se déplacer à grande vitesse en roulant. Doté d'un aiguillon venimeux, le seul moyen d'échapper à ce dangereux serpent était de sauter à travers l'anneau qu'il formait, ce qui le désorientait et le rendait incapable de faire demi-tour. On trouverait le *hoop snake* dans diverses régions d'Amérique du Nord et aussi une variété dans les grands espaces australiens. Inutile de préciser que l'existence de cet étrange serpent n'a jamais été démontrée.

Mais existe-t-il des animaux qui roulent en utilisant soit leur corps entier, soit des parties mobiles, des « roues », ou cela est-il l'apanage des animaux imaginaires ? Ces derniers sont nombreux. L'artiste hollandais M. C. Escher, sur une lithographie de 1951 intitulée *Wentelteefje* (*Curl-up* en anglais), a représenté *Pedalternorotandomovens centroculatus articulatus*, une bête fictive, articulée et hexapode qui s'enroule sur elle-même puis se met à rouler. Dans un autre domaine, Sonic – le hérisson de la série de jeux vidéo éponyme, développée par la firme japonaise Sega depuis 1991 – se déplace en roulant très rapidement sur lui-même.

Ce déplacement par roulage est très apprécié des enfants et des gymnastes,



**DANS L'ÉPISODE 7 DE STAR WARS**, le robot BB-8, composé d'un corps sphérique surmonté d'une tête en lévitation magnétique, roule en modifiant la position de son centre de gravité ; ce qu'il fait en déplaçant ses composants internes.

mais peu d'humains adultes l'utilisent. En revanche, certains organismes allongés sont capables de déformer leur corps pour former une boucle et, éventuellement, de rouler. C'est le cas de la chenille, du myriapode, de la crevette-mante et de la salamandre. D'autres adoptent une posture plus proche de la sphère, tels le pangolin et le tatou (qui se protègent aussi en se roulant en boule), le lézard d'Armardille (dont le nom savant *Ouroborus cataphractus* évoque l'Ouroboros), l'isopode et la dame blanche, une araignée de Namibie qui dévale les dunes en roulant sur elle-même. Ces espèces peuvent rouler passivement, en utilisant la gravité par exemple, ou activement, en déformant leur corps pour modifier la position de leur centre de gravité. On retrouve ce mode de locomotion chez le robot TARS du film *Interstellar* (Christopher Nolan, 2014).

Les plantes ne sont pas en reste, comme le montrent la plupart des graines et le virevoltant, bien connu des amateurs de westerns. Il s'agit d'un ensemble de tiges ramifiées qui, une fois sèches, se détachent de la racine de certaines plantes des déserts du sud des États-Unis. Sa forme à peu près sphérique lui permet de rouler au gré du vent et de répandre ses graines.

Le mouvement de rotation pourrait se limiter à une partie du corps, telle la roue autour d'un axe. En dépit de l'ubiquité de la roue dans les véhicules humains, aucun organisme terrien ne semble l'avoir adopté. L'une des rares structures biologiques