

La population de râles de Cuvier compte entre 5100 et 7500 individus et n'est pas en danger selon l'Union internationale pour la conservation de la nature.

EN CHIFFRES

31

Parmi les 150 espèces connues de rallidés – famille d'oiseaux qui compte notamment les foulques et les poules d'eau –, 31 ont évolué vers la perte du vol.

400

C'est le nombre d'espèces et de sous-espèces de vertébrés, d'invertébrés et de plantes endémiques de l'île d'Aldabra selon l'Unesco. En 1983, l'une d'elles, la fauvette d'Aldabra (*Nesillas aldabrana*), s'est éteinte à cause de la prédation des rats surmulots.

150 000

C'est l'effectif de la population de tortues géantes des Seychelles (*Aldabrachelys gigantea*) sur l'atoll d'Aldabra. Ces tortues peuvent atteindre 1,2 mètre pour 300 kilogrammes – une taille supérieure à celle des tortues géantes des Galápagos (*Chelonoidis nigra*).



Cet oiseau de la sous-espèce *D. c. cuvieri*, photographié sur une plage des Seychelles, est capable de voler, contrairement à la sous-espèce endémique d'Aldabra.

naturalistes grâce à sa flore et à sa faune, qui comptent bon nombre d'espèces endémiques. En particulier, on y trouve la plus grande colonie de tortues géantes des Seychelles (*Aldabrachelys gigantea*). Pour la tortue verte (*Chelonia mydas*), c'est le site de ponte le plus important de l'océan Indien. Deux espèces et onze sous-espèces d'oiseaux y sont endémiques, dont le râle de Cuvier.

L'île d'Aldabra présente une autre originalité: on y connaît trois importants gisements fossilifères comportant des restes de vertébrés, ce qui est rare sur des atolls, où les conditions ne sont en général pas propices à une fossilisation. Deux sites, à l'extrémité ouest de l'atoll (Bassin Cabri et Bassin Lebine), sont plus anciens que l'âge du calcaire qui les recouvre, à savoir 136 000 ans. Le troisième, Point Hodoul, à l'extrémité est, est plus jeune: il remonte à 100 000 ans. Une équipe anglaise autour des paléontologues Julian Hume, du Muséum d'histoire naturelle de Tring, et David Martill, de l'université de Portsmouth, les a méthodiquement étudiés.

Or différents dépôts sédimentaires, dont des assises de calcaire et de >

Seychelles), il y est devenu aptère. Sur l'île d'Aldabra, entre les Seychelles et les Comores, il a même donné une sous-espèce endémique, *Dryolimnas cuvieri aldabranus*. Or celle-ci est une vraie curiosité d'ornithologue, comme le montre son histoire évolutive, récemment reconstruite grâce à différents gisements de fossiles.

UN ATOLL PLUSIEURS FOIS SUBMERGÉ

Situé au nord-ouest de Madagascar, Aldabra est le deuxième atoll le plus grand du monde, après l'île Christmas, de l'archipel des Kiribati. Classé dès 1982 au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco, l'atoll est célèbre chez les



Râle de Cuvier
(*Dryolimnas cuvieri*)
Taille: environ 30 cm

phosphorite, prouvent que l'atoll, qui actuellement culmine à 8 mètres au-dessus du niveau de la mer, a été complètement submergé à plusieurs reprises. Deux inondations certaines datent d'environ 340 000 et 12000 ans, et deux autres se sont vraisemblablement intercalées il y a 240000 et 200000 ans.

Évidemment, la submersion complète d'un atoll entraîne l'éradication de l'ensemble des faune et flore terrestres. La plus récente a donc causé l'extinction des nombreuses espèces de vertébrés retrouvées dans le gisement du Bassin Cabri, dont deux oiseaux endémiques (un pétrel et un canard), un crocodile à corne endémique, une tortue géante, un iguane et des scinques... L'étude paléontologique du gisement de Point Hodoul, postérieur, montre qu'après réémergence de l'atoll, la recolonisation a été rapide. Si les oiseaux et le crocodile ont complètement disparu, les autres espèces, non endémiques, sont revenues et comptent parmi les fossiles du site.


LA PARTICULARITÉ DU RÂLE DE CUVIER

Les gisements renferment des restes osseux de râle de Cuvier. Dans le plus ancien, celui du Bassin Cabri, ce sont deux humérus. De taille réduite, ils sont quasiment identiques à ceux du râle de Cuvier d'Aldabra moderne (*D. c. aldabranus*). Dans le gisement plus récent (Point Hodoul), il s'agit d'un tarsométatarse. Chez les oiseaux modernes, en effet, les homologues du tarse (cheville) et du métatarse (pied) des mammifères sont fusionnés en un seul os, le tarsométatarse (voir l'encadré ci-dessus). Celui de Point Hodoul paraît plus trapu, plus robuste que ceux des râles de Cuvier d'Aldabra modernes, eux-mêmes plus trapus et robustes que ceux des râles de Cuvier d'autres îles ayant conservé leur capacité de voler (sous-espèce *D. c. cuvieri*). Cela suggère que les râles de Point Hodoul étaient meilleurs coureurs que les oiseaux actuels. Or un oiseau qui perd le vol devient coureur, ce qui entraîne l'accroissement de la puissance de ses pattes. Les râles de Point Hodoul étaient donc très probablement aptères.

La présence du râle de Cuvier dans ces gisements du Pléistocène paraît très étrange. En effet, la petite taille des humérus du Bassin Cabri prouve que l'oiseau avait déjà perdu l'aptitude au vol. Étant strictement terrestre, il a donc dû disparaître au moment de la dernière

LE SECRET DU TARSSOMÉTATARSE

Les rallidés, comme ce râle de Cayenne (*Aramides cajaneus*), sont dotés de fortes pattes et de petites ailes. Les os fossiles trouvés sur l'atoll d'Aldabra sont des humérus (en bleu) et des tarsométatarses (en rouge). Lorsque l'oiseau perd la faculté de voler, l'aile s'atrophie et l'humérus devient très court. L'oiseau devenant coureur, le tarsométatarse se renforce, en particulier à ses extrémités, au niveau des articulations. Le tarsométatarse est une curiosité des oiseaux et de bon nombre de dinosaures. En effet, leurs os du tarse (homologue de notre cheville) se séparent en deux lots : la partie distale (en bas) fusionne avec le métatarse pour donner le tarsométatarse ; la partie proximale (en haut) fusionne avec le tibia pour donner le tibiotarse, l'os du pilon (en vert). L'articulation de la cheville passe donc au milieu du tarse, alors que la nôtre se situe entre le tarse (avec l'astragale) et le couple tibia-péroné.



submersion de l'atoll. Or le râle de Cuvier est revenu sur l'île au moins une fois entre la formation des deux gisements et n'a pu le faire qu'en volant, ce qui signifie que l'oiseau a perdu au moins à deux reprises la possibilité de voler.

Comparons les deux événements évolutifs, séparés de plusieurs dizaines de milliers d'années. Des oiseaux de la même espèce, c'est-à-dire avec des génomes comparables, arrivent à deux moments différents sur un atoll, c'est-à-dire dans des écosystèmes comparables. Mêmes capacités d'évolution, mêmes interférences environnementales. Il en résulte une évolution similaire. Les biologistes appellent cela de l'évolution parallèle. Différents cas sont bien circonscrits, avec des lieux différents. Par exemple, le râle de Cuvier de la sous-espèce *D. c. abbotti*, aujourd'hui disparu, était lui aussi aptère, mais endémique de l'île de l'Assomption, également dans l'archipel des Seychelles. Par ailleurs, une équipe de l'université de Pennsylvanie a montré en 2012 que les canards-vapeur ou brassemers (genre *Tachyeres*), qui vivent en Patagonie et dans les îles Malouines, ont perdu trois fois indépendamment la faculté de voler. Étonnant, dans le cas du râle de Cuvier, est que l'on ait eu la possibilité de démontrer la répétition d'un même processus évolutif à partir d'une même espèce, au même endroit. ■

BIBLIOGRAPHIE

J. Hume et D. Martill, **Repeated evolution of flightlessness in Dryolimnas rails (Aves : Rallidae) after extinction and recolonization on Aldabra**, *Zool. J. Linn. Soc.*, article zlz018, 2019.

J. Hume et al., **A terrestrial vertebrate palaeontological review of Aldabra atoll**, Aldabra group, Seychelles, *PLoS One*, vol. 13(3), article e0192675, 2018.

T. Fulton et al., **Multiple losses of flight and recent speciation in steamer ducks**, *Proc. R. Soc. B*, vol. 279(1737), pp. 2339-2346, 2012.